

PROPÓSITO:GUÍA # 2---**INFERIR INFORMACIÓN DE FORMA CONTEXTUALIZADA.****MOTIVACIÓN:**

OBSERVA EL SIGUIENTE VÍDEO: Y COPIA EN TU CUADERNO UNA SÍNTESIS DEL CONCEPTO Y LO MÁS RESALTANTE DE

EXPLICACIÓN:

LA INFERENCIA

COPIA EN TU CUADERNO TODO LO QUE ESTÁN EXPLICANDO SOBRE LAS INFERENCIAS EN EL VIDEO ANTERIOR.

REALIZA UNA SÍNTESIS DE TODA LA INFORMACIÓN OFRECIDA EN EL VIDEO

EJERCICIOS:

-OBSERVA, RESPONDE LAS PREGUNTAS ESCRIBE EN TU CUADERNO QUÉ INFORMACIÓN PUEDES OBTENER DE ESTA IMAGEN:

CEIP Ntra. Sra. de Lareto
PLAN DE LECTURA

FICHA DE LECTURA Nº 20

PARA RÁPIDO ALIVIO DE:
Trastornos estomacales – Hiperacidez gástrica – Excesos de comida y bebida – Dolores de cabeza – Neuralgias – Fatiga y dolores musculares – Síntomas de resfriado

INSTRUCCIONES

Vía oral.
ALKA-SELTZER debe tomarse siempre disuelto en agua.
ADULTOS: 1 ó 2 comprimidos disueltos en agua hasta un máximo de 10 comprimidos al día.
NIÑOS: la mitad de la dosis. Para niños menores de 3 años consultar a su médico.

<p>P.V.P. 2,5 € Imp. Incl.</p>	<p>Cada comprimido contiene</p> <p>Ácido Acetilsalicílico 0,32 gr.</p> <p>Fosfato Monocálcico 0,20 gr.</p> <p>Bicarbonato de Sodio 1,90 gr.</p> <p>Ácido Cítrico 1,05 gr.</p>	<p>ALKA – SELTZER disuelto en agua se transforma en:</p> <p>Acetilsalicilato Sódico</p> <p>Fosfato Sódico Cálcico</p> <p>Bicarbonato de Sodio</p> <p>Citrato Sódico</p>
--------------------------------	---	---

Registrado en la D G F M con el nº E N 40876
Fabricado en España por:
BAYER

Lot. V – 008/2
CARL ENE 2008



OBSERVO Y CONTESTO:

- ¿Cuándo se debe tomar este medicamento?
Dolores de cabeza – Mala visión – Estreñimiento – Anemia – Picoazón de la piel – Diarrea – Estado nervioso
- Un niño de 9 años, ¿cuántos comprimidos puede tomar al día?
- ¿Cuál es la fecha de caducidad del medicamento?
- ¿El día 18 de Marzo de 2008 podré tomarme este medicamento? ¿Por qué?
- ¿Cómo podré tomarme este medicamento?

EVALUACIÓN:

-SUSTENTACIÓN DE LA GUIA

BIBLIOGRAFÍA: