

anticonceptivo
El preservativo
El espermicida
El preservativo femenino
El diafragma
La esponja vaginal
La píldora
La píldora del día después

Evaluación

1. ¿CUALES SON LOS DÍAS FÉRTILES, ES DECIR, EN LOS QUE UNA MUJER PUEDE QUEDAAR EMBARAZADA?

R/: Si una mujer va a tener su próxima regla, por ejemplo, un 20 del mes, su ovulación será unos 14 días antes, es decir, el día 6 de ese mes. Sus días fértiles serán por tanto desde dos días antes de esa fecha a dos días después: del 4 al 8 de ese mes puede surgir el embarazo.

2. ¿EN CUÁL DÍA DEL CICLO MENSTRUAL ES PROBABLE QUE SE PRODUZCA LA FECUNDACIÓN?

R/: Generalmente solamente existe posibilidad de que se produzca la fecundación en la fase del ciclo menstrual en que se ha producido la ovulación, a partir del día 14, aproximadamente, y solamente durante 1 a 3 días, aproximadamente, después de la ovulación; el tiempo en que el óvulo puede sobrevivir antes de degenerar.

3. ¿CUÁLES SON LOS DÍAS EN QUE SE PRODUCE LA MENSTRUACIÓN?

R/: El ciclo menstrual, puede durar entre 23 y 35 días, el promedio es de 28. Se cuenta como día 1 del ciclo al día en el que comienza la menstruación, aunque sólo sean una gotitas. El ciclo termina con el inicio de la siguiente menstruación.

4.¿ES POSIBLE LA FECUNDACIÓN SI LOS ESPERMATOZOIDES HAN ENTRADO A LA VAGINA ANTES DEL PERIODO FÉRTIL? EXPLICA.

R/: no porque los espermatozoides tienen un tiempo determinado de vida se supone que los espermatozoides deben fecundar durante el periodo fértil no antes porque morirían antes del periodo ya mencionado.

5.¿QUÉ TAMBIÉN CONOCES Y USAN LAS PERSONAS LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS.

R/: No solo se utilizan los anticonceptivos para prevenir un embarazo -estos pueden traer otros beneficios. Algunos tipos de anticonceptivos de base hormonal (como la pastilla, el parche, el anillo, la inyección, el implante o el DIU hormonal) pueden reducir los dolores menstruales y SPM, y aligerar la menstruación.

6. QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE ANTICONCEPCIÓN Y ABORTO

Los métodos hormonales anticonceptivos, que incluyen la anticoncepción de emergencia, evitan el embarazo inhibiendo la ovulación y la fertilización (ACOG, 1998). El aborto inducido por medicamentos termina un embarazo sin un procedimiento quirúrgico.